

## **ХАРАКТЕР УРАЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТ ЗА УМОВ КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНИМ ПІЕЛОНЕФРИТОМ**

***O. В. Залявська, І.Б. Горбатюк***

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та  
професійних хвороб, Буковинський державний медичний  
університет, Чернівці

**Ключові слова:** реактивний артрит, функціональний стан нирок, хронічний піелонефрит, швидкість клубочкової фільтрації.

**Вступ.** Реактивні артрити (РеА) різної етіології досить часто ускладнюються розвитком гломерулонефриту і піелонефриту, іноді навіть швидкопрогресуючою нирковою недостатністю [2, 5-7, 10, 11]. Тому окремі симптоми ураження нирок (мікрогематурія, мікроальбумінурія, підвищення сироваткового креатиніну) зустрічаються при РеА досить часто – до 35 %, що є ознакою наявності хронічної хвороби нирок (ХХН). В більшості наукових літературних джерел вказана певна частота розвитку амілоїдозу нирок при реактивних артритах – це 6-13% [3]. Морфологічно хвороба Рейтера найчастіше має перебіг у вигляді мезангіо-проліферативної IgA-нефропатії [8]. Відомі випадки виникнення і пухлин нирок на тлі РеА [9].

Питання патогенезу нефропатії залишається актуальним на сьогодні. Що лежить в основі розвитку порушення функції нирок у хворих на РеА: висхідна перsistуюча урогенітальна інфекція, яка є пусковим механізмом генетично детермінованої аномалії імунної системи з підвищеною продукцією прозапальних цитокінів, викликаючи, у свою чергу, ушкодження канальцевого відділу нефрону, чи довготривалий прийом НПЗП [1, 4, 12]?

**Мета роботи:** дослідити функціональний стан нирок у хворих на РеА за умов коморбідності з хронічним піелонефритом.

**Матеріали і методи дослідження.** У дослідженні взяли участь 52 особи, яких розподілено на дві групи: першу групу скла-

ли пацієнти з реактивним артритом, активністю І-ІІІ ст., ФНС І-ІІІ ст. із супутньою ХХН І-ІІ ст.: пієлонефритом у фазі загострення ( $n=32$ ); другу групу – пацієнти з ХХН І-ІІ ст.: пієлонефритом у фазі загострення з сечовим синдромом ( $n=20$ ). У осіб даної групи суглобовий синдром не спостерігався. Групи хворих були рандомізовані за віком, статтю та тривалістю перебігу захворювання. Середній вік обстежених осіб складав  $27,7 \pm 3,4$  років. Середня тривалість захворювання  $4,0 \pm 0,94$  роки. Дослідження функціонального стану нирок проводили за допомогою кліренс-методу оцінки судинно-клубочкового і канальцевого відділу нефрому в умовах спонтанного 12-годинного діурезу (Шюк О., 1981). Концентрацію калію та натрію в сечі визначали методом фотометрії полум'я на «ФПЛ-1», креатиніну у плазмі крові та сечі – за реакцією з пікриновою кислотою з реєстрацією показників екстинції на фотокалориметрі «КФК-2» і спектрофотометрі «СФ-46». Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) визначали розрахунковим методом за допомогою формул Cockroft-Gault. Здатність нирок концентрувати і розбавляти сечу оцінювали за концентраційним коефіцієнтом натрію та концентраційним індексом ендогенного креатиніну. Для оцінки транспорту натрію в нирках використовували показники екскреції натрію та його кліренсу. Концентрацію нітратів у сечі (метаболітів оксиду азоту) вивчали з використанням редактора-відновлювача («Nitrate redactor»), що містить кадмій і мідь, а вимірювання проводили на спектрофотометрі («СФ-46», Росія). Для оцінки рівнів фібронектину і  $\beta_2$ -мікроглобуліну ( $\beta_2$ -МГ) в сечі – ридер «PR2100-Sanofi» (Франція).

**Результати та їх обговорення.** При порівнянні результатів ЗАК між клінічними групами (табл. 1) у пацієнтів 1-ї групи встановлено достовірно більш високий рівень ШОЕ, ніж в хворих 2-ї групи ( $p<0,05$ ). За вмістом абсолютної та відносної кількості лейкоцитів, еритроцитів, рівнем гемоглобіну, кількості тромбоцитів статистично достовірних відмінностей не визначено. Сироваткові рівні креатиніну, сечовини та сечової кислоти не перевищували межі норми в жодному випадку, але спостерігалася вірогідна відмінність

середніх значень при порівнянні між групами. Так, зростання креатиніну в крові встановлено у хворих 1-ї групи порівняно з 2-ю групою ( $p<0,05$ ).

Таблиця 1

**Показники клінічного та біохімічного аналізу крові у хворих на реактивний артрит залежно від наявності супровідного ХП, ( $M\pm m$ )**

<b>Показники</b>	<b>1-а група (n=32)</b>	<b>2-а група (n=20)</b>
ШОЕ, мм/год	$28,1\pm4,04\#$	$16,5\pm0,9$
Креатинін крові (мкмоль/л)	$82,9\pm1,70\#$	$56,8\pm3,47$
Сечовина крові (ммоль/л)	$6,7\pm0,16$	$5,32\pm1,42$
Сечова кислота крові (мкмоль/л)	$303,83\pm11,9$	$268,13\pm8,3$

*Примітка:* # – різниця вірогідна порівняно із 2-ю групою хворих ( $p<0,05$ ).

У хворих на РeA 1-ї групи у 34,4 % (n=11) виявлено протеїнурію: рівень білка в сечі в середньому склав  $0,23\pm0,023$  г/добу. Лейкоцитурія виявлялася в 100 % осіб даної групи, з них у 78,1 % (n=25) осіб вона була незначною, а у 21,9% (n=7) – значна. Еритроцитурію виявлено в 15,6 % (n=5) осіб. У хворих 2-ї групи протеїнурію виявлено в 25,0 % (n=5). Рівень білка в сечі склав у середньому  $0,28\pm0,08$  г/добу, що перевищувало в 1,2 раза показник в 1-й групі. Лейкоцитурію виявлено у 100% осіб, з яких незначну – у 60,0 % (n=12), а у 40,0 % (n=8) – значну. Еритроцитурія проявлялася в 15,0 % (n=3) осіб. Відсутність яскраво вираженої лейкоцитурії не є показником відсутності запального процесу в нирках.

Загальноприйнятими критеріями ураження нирок вважають рівень креатиніну в сироватці крові та протеїнурію, але ці показники свідчать уже не про ранню стадію ураження нирок, а про явні структурні зміни нирок. Рання діагностика ураження нирок дає

можливість своєчасно надавати адекватну медичну допомогу з метою профілактики формування і прогресування нефропатії та ниркової недостатності.

Саме тому проведено визначення таких ранніх маркерів пошкодження клубочкового та канальцевого відділів нефрону, як  $\beta_2$ -мікроглобулінурії, фібронектинурії та нітратурії.

Встановлено вірогідне зростання параметрів фібронектинурії та нітратурії у хворих 1-ї групи порівняно з 2-ю ( $p<0,05$ ). Також спостерігалося максимальне підвищення  $\beta_2$ -мікроглобулінурії у хворих 1-ї групи. Від статі обстежених пацієнтів концентрації переведених сполук у сечі не залежали (табл. 2).

Наростання рівня  $\beta_2$ -МГ в сечі спостерігається тільки при тубулярних дисфункціях – порушенні реабсорбції і катаболізму в проксимальних канальцях нирок, а фібронектинурія відбиває здебільшого клубочкові ураження. Основний шлях виведення і метаболізму  $\beta_2$ -МГ здійснюється через нирки. Він повністю фільтрується через базальну мембрну гломерул і на 99,9 % реабсорбується клітинами проксимальних канальців шляхом піноцитозу. Важлива діагностична цінність  $\beta_2$ -МГ полягає в тому, що підвищена його екскреція із сечею спостерігається у пацієнтів із канальцевою протеїнурією, при цьому гломерулярна фільтрація ще залишається нормальнюю і клінічних ознак порушення функції нирок може ще не бути.

Одним із найважливіших медіаторів сечової системи є оксид азоту. У даний час вважається загальновизнаним, що в ендотеліальних, мезангіальних і епітеліальних клітинах нирок відбувається постійний синтез оксиду азоту, що регулює ренальний кровотік і екскреторну функцію. Оксид азоту відіграє суттєву роль у нирковій регуляції електролітного обміну і є потужним модулятором прогресування запалення.

Таблиця 2

**Показники фібронектинурії,  $\beta_2$ -мікроглобулінурії та нітратурії у обстежених осіб, ( $M\pm m$ )**

<i>Показники</i>	<i>1-а група (n=32)</i>	<i>2-а група (n=20)</i>
Фібронектинурія, мкг/л	490,3±1,71#	470,1±1,83
$\beta_2$ -мікроглобулінурія, мкг/л	44,1±1,47	42,2±2,01
Нітратурія, мкмоль/л	5,6±0,05#	5,4±0,04

*Примітка:* # – різниця вірогідна порівняно із 2-ю групою хворих ( $p<0,05$ ).

Таблиця 3

### **Показники функціонального стану нирок у хворих на реактивний артрит залежно від наявності ХП, (M±m)**

<i>Показники</i>	<i>ПЗО (n=20)</i>	<i>1-а група (n=32)</i>	<i>2-а група (n=20)</i>
Діурез, мл/12 год	524,50±25,68	762,64±40,01*	741,70±36,14*
Вміст калію в сечі, ммолль/л	43,18±1,14	29,47±2,01*	31,45±1,19*
Екскреція калію, ммолль/12 год	7,90±0,77	6,05±0,53	7,65±0,81
Вміст креатиніну в сечі, ммолль/л	14,32±1,12	8,40±0,43*×	11,87±0,41
ШКФ, мл/хв×1,73м <sup>2</sup>	120,6±1,34	76,9±2,49*	85,2±5,31*
Канальцева реабсорбція, %	99,52±0,06	98,15±0,11*	98,1±0,12*
Вміст натрію в сечі, ммолль/л	154,60±1,48	136,12±1,01* ×	148,6±1,37*
Кліренс натрію, мл/хв	0,79±0,07	1,29±0,06*×	0,83±0,07
Екскретована фракція натрію, %	0,60±0,07	1,35±0,07*×	0,72±0,09

---

*Примітка:* \* – різниця вірогідна порівняно із групою ПЗО ( $p<0,05$ );

\* – різниця вірогідна порівняно із 2-ю групою хворих ( $p<0,05$ ).

У пацієнтів 1-ї групи діурез зростав на 45,4 % (див. табл. 3), а концентрація калію в сечі знижувалася на 46,5 % при одночасному вірогідному зниженні канальцевої реабсорбції порівняно з групою контролю ( $p<0,05$ ). Виявлено тенденцію до зниження екскреції калію. Спостерігалося статистично вірогідне зниження швидкості клуб очкової фільтрації (ШКФ) на 45,7 % відносно показників групи здорових осіб ( $p<0,05$ ). Щодо транспорту натрію виявлено, що його концентрація в сечі у пацієнтів 1-ї групи була вірогідно нижче показників у другій групі та групі ПЗО на 9,2 % і 13,6 % відповідно за одночасного підвищення кліренсу натрію та його екскретованої фракції ( $p<0,05$ ). Виявлено достовірне зниження рівня креатиніну в сечі у осіб 1-ї групи порівняно з показниками 2-ї та контрольної груп ( $p<0,05$ ).

**Висновок.** У хворих на реактивний артрит із коморбідним перебігом хронічного пієлонефриту діагностовано ураження нирок на рівні як канальцевого, так і клубочково-судинного апарату, що проявлялося вірогідним зростанням параметрів фібронектинурії та нітратурії, зниженням рівня креатиніну в сечі та ШКФ, більш вираженим сечовим синдромом.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Кундер Е. В. Роль цитокинов в развитии системного и локального воспаления при спондилоартропатиях / Е.В. Кундер // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2010. – № 2. – С. 12–17.
2. Acute renal failure complicating nonfulminant hepatitis a in HLAB27 positive patient / N. Brncic, D. Matic-Glazar, I. Viskovic [et al.] // Ren. Fail. – 2000. – Vol. 22, № 5. – P. 635–640.
3. Amyloidosis and Reiter's syndrome: report of a case and review of the literature / C. J. Anderson, M. C. Gregory, G. C. Groggel, D. O.

Clegg // Am. J. Kidney Dis. – 2000. – Vol. 14, № 4. – P. 319–323.

4. Eras J. NSAIDs and the kidney revisited: are selective cyclooxygenase-2 inhibitors safe / J. Eras, M. A. Perazella // Am. J. Med. Sci. – 2008. – Vol. 321, № 3. – P. 181–190.

5. Horst-Bruinsma I.E. Comorbidities in patients with spondyloarthritis / I. E. Horst-Bruinsma, M. T. Nurmohamed, R. B. Landewe // Rheum. Dis. Clin. North. Am. – 2012. – Vol. 38, № 3. – P. 523-38.

6. Rapid clinical course of glomerulonephritis accompanying postinfectious reactive arthritis / E. Gindzienska-Sieskiewicz, K. Bernacka, B. Lewandowski // Pol. Merkuriusz Lek. – 2002. – Vol. 5, № 27. – P. 147–148.

7. Recommendations for use of selective and nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs: an American College of Rheumatology white paper / American College of Rheumatology Ad Hoc Group on Use of Selective and Nonselective Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs // Arthritis Rheum. – 2008. – Vol. 59, 8. – P. 1058–1073.

8. Reiter's disease, keratoderma blennorrhagica and rapidly progressive (crescentic) IgA glomerulonephritis / F. G. Inglis, I. Henderson, S. Sanders, M. Kerr // Nephrol. Dial. Transplant. – 2004. – Vol. 9, № 7. – P. 824–826.

9. Renal cell carcinoma and Reiter's syndrome / F. Campante, T. Lopes, P. Farelo, M. de Sousa // Acta Med. Port. – 2002. – Vol. 5, № 2. – P. 100–103.

10. Renal involvement in ankylosing spondylitis: prevalence, pathology, response to TNF-a blocker / S. H. Lee, E. J. Lee, S. W. Chung [et al.] // Rheumatol. Int. – 2013. – Vol. 33, № 7. – P. 1689–1692.

11. Urinary tract and renal findings in acute Yersinia infections / M. Korpela, J. Mustonen, A. Pasternack, P. Leinikki // Acta Med. Scand. – 2002. – Vol. 220, № 5. – P. 471–476.

12. Wali R. K. Recent developments in toxic nephropathy / R. K. Wali, W. L. Henrich // Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. – 2010. – Vol. 11, № 2. – P. 155–163.

## РЕЗЮМЕ

# ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ С КОМОРБИДНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

*Заливская Е. В., Горбатюк И. Б.*

*(Черновцы)*

**Цель:** изучить функцию почек у пациентов с коморбидным течением реактивного артрита и хронической болезни почек (ХБП): пиелонефрит (ХП) в фазе обострения. **Материалы и методы:** В исследовании приняли участие 52 человека, которые разпределены на две группы. В 1-ю группу включено пациентов с диагнозом реактивный артрит (РеА) и хронический пиелонефрит ( $n=32$ ), а в 2-ю группу – с диагнозом ХБП: пиелонефрит, мочевой синдром ( $n=20$ ). Исследование включало пациентов с средней продолжительности заболевания у  $4,0 \pm 0,94$  лет. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Концентрация нитритов в моче были изучены с использованием редактора-восстановителя («Nitrate redactor»), а измерения проводили на спектрофотометре ("SF-46", Россия). Для оценки уровня фибронектина и  $\beta 2$ -микроглобулина в моче – ридер «PR2100-Sanofi» (Франция). **Результаты:** В 1-й группе обнаружено повышение фибронектинурии и нитритурии в сравнении с показателями в группе больных с хроническим пиелонефритом ( $p<0,05$ ) и максимальное увеличение  $\beta 2$ -микроглобулина в моче. Установлено повышение диуреза на 45,4 % ( $p <0,05$ ) и СКФ на 45,7 % ( $p <0,05$ ), снижение концентрации калия в моче на 46,5 % и канальцевой реабсорбции ( $p<0,05$ ) у пациентов 1-й группы в сравнении с показателями в контрольной группе. **Выводы.** У больных с коморбидным течением реактивного артрита и хронического пиелонефрита диагностировано поражение почек на уровне как канальцевого так и клубочково-сосудистого аппарата, что проявлялось достоверным ростом параметров фибронекти-урии и нитритурии, снижением уровня креатинина в моче и СКФ, более выраженным мочевым синдромом.

**Ключевые слова:** реактивный артрит, функция почек, хрони-

ческий пиелонефрит, скорость клубочковой фильтрации.

## SUMMARY

# THE CHARACTER OF KIDNEY DAMAGE IN PATIENTS WITH A COMORBID COURSE OF REACTIVE ARTHRITIS AND CHRONIC PYELONEPHRITIS

*Zaliavsko O.V., Gorbatyuk I.B.*

*(Chernivtsi)*

**Aim:** To study the renal function in patients with a comorbid course of reactive arthritis and chronic kidney disease (CKD): pyelonephritis (CP) the exacerbation phase. **Materials and methods:** It was examined 53 patients. They were divided into two groups: the 1-st group with diagnosed reactive arthritis (ReA) and comorbidity of chronic pyelonephritis ( $n=32$ ) and 2-nd group with diagnosed CKD: pyelonephritis, urinary syndrome ( $n=20$ ). Study included patients with average disease duration for  $4,0 \pm 0,94$  years. The control group was formed of 20 healthy persons. The concentration of nitrites in urine were studied using a reducing redactor («Nitrate redactor») and measurements were performed on a spectrophotometer ("SF-46", Russia). To assess the levels of fibronectin and  $\beta_2$ -microglobulin in urine – reader «PR2100-Sanofi» (France). **Results:** In the 1-st group was detected increased fibronectin and nitrite in the urine in comparison with indexes in the group of patients with chronic pyelonephritis ( $p<0.05$ ) and a maximal increase  $\beta_2$ -microglobulin in the urine. Was established increased diuresis for 45,4 % ( $p<0.05$ ) and GFR at 45,7 % ( $p<0.05$ ), the concentration of potassium in the urine decreased for 46,5 % and simultaneously tubular reabsorption reduced ( $p<0,05$ ) in patients of the 1-st group in comparison with indexes in the control group. **Conclusions.** In patients with a comorbid course of reactive arthritis and chronic pyelonephritis was established kidney damage as tubular and glomerular-vascular apparatus which was manifested by increased fibronectin and nitrite in the urine, decrease the creatinine level in urine and GFR.

**Key words:** reactive arthritis, renal function, chronic pyelonephritis, glomerular filtration rate.

